



A D V E N


पशुधन की सुगम पशु चिकित्सा हेतु एडवेन की होम्योपैथिक उत्पाद विवरणिका



HOMOEOPATHIC
VETERINARY MEDICINES

WWW.ADVEN.IN

एड-लिव वेट सिरप



संकेत

- लिवर में सूजन व पीलिया में लाभकारी
- भूख न लगना
- चारा पचाने की प्रक्रिया में लगातार कमी होना
- शरीर में लगातार कमज़ोरी व थकावट होने पर

संघटक

चेलिडोनियम 3X, कार्डस मेरियनस Q, सिनकोना ऑफिसिनलिस Q, शियोनाइन्थस वर्जिनिका 2X, कालमेघ Q, त्रिकोसंथेस डियोकां Q, कालियम मूरिएटिकम 6X, नैट्रम सल्फ्यूरिकम 6X

खुराक:

रोटी के 1/2 हिस्से में 5–10 मि.ली. एड-लिव वेट सिरप की मात्रा डाल कर या (5–10 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए एड-लिव वेट सिरप को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 100 मि.ली.

आस्था-विन वेट ड्रॉप्स



संकेत

- सभी प्रकार की खांसी में लाभकारी
- सूखी खांसी में जमा म्यूकस को पतला कर बाहर निकालने में लाभकारी
- म्यूकस के कारण सांस लेने में तकलीफ व नाक बंद होने में तुरंत लाभकारी
- सांस लेने में कठिनाई को कम करें
- सांस लेते समय गले में घरघराहट या बार बार धौंसने पर अत्यंत लाभकारी

संघटक

ब्रायोनिया अल्बा 30, नेट्रम सल्फ्यूरिकम 30, एंटिमोनियम टार्टरिकम 30, फेरम फॉस्फोरिकम 30, कालियम सल्फ्यूरिकम 30, आर्सेनिकम एल्बम 30, कालियम म्यूरिएटिकम 30

खुराक:

रोटी के 1/4 हिस्से में 15–20 दंडें आस्था विन वेट ड्रॉप्स की डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर पहले तीन दिन, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) दें और बाद में सुबह-शाम दिन में दो बार पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए आस्था विन वेट ड्रॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

डायरोक्विल सिरप



संकेत

- पिचकारी की तरह होने वाले पतले दस्त में लाभकारी
- गोबर के साथ खून या म्यूक्स के आने पर तुरंत लाभकारी
- मौसम व चारे के बदलने पर होने वाले दस्तों में लाभकारी

संघटक

आर्सेनिकम एल्बम 200, सिनकोना ऑफिसिनैलिस 200, केमोमिला 200, मर्क्यूरियस सौलुब्लिस 200, सल्फर 200

खुराक:

रोटी के $\frac{1}{2}$ हिस्से में 5–10 मि.ली. डायरोक्विल सिरप की मात्रा डाल कर या (5–10 मि.ली.) छोटी सीरिज (विना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दे या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए डायरोक्विल सिरप को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 100 मि.ली.

डाइजेक्स—वेट झॉप्स



संकेत

- मौसम व चारे के बदलने के कारण होने वाली बदहजमी व भूख न लगने पर तुरंत लाभकारी
- लम्बे समय तक बीमार रहने के कारण भूख न लगना या चारा न खाने की स्थिति में लाभकारी
- पेट में दर्द व बार बार चारा मुँह से बाहर निकालने पर या उल्टी होने पर

संघटक

नक्स वोमिका 30 C, कार्बो वेजिटेबल्स 30 C, पल्सेटिला निगरिकन्स 30 C, नैट्रम सल्फरिकम 30 C, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 30

खुराक:

रोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में डाइजेक्स—वेट झॉप्स की 15–20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिज (विना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर पहले तीन दिन, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) दें और बाद में सुबह—शाम दिन में दो बार पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए डाइजेक्स—वेट झॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

डी-वॉर्म वेट ड्रॉप्स



संकेत

- सभी प्रकार के पेट के कीड़ों को बाहर निकालने (डीवॉर्मिंग) में लाभकारी
- पेट के कीड़ों के कारण पशुओं में धीरे धीरे भूख का कम होना
- कीड़ों के कारण पतला व बदबूदार गोबर (दस्त) होना
- शरीर में लगातार कमजोरी, वजन व दूध कम होना

संघटक

फेरम म्यूरिएटिकम 30 C, चेलोन ग्लबरा 30 C, एम्ब्रा ग्रीसिया 30 C, ट्युक्रियम मेरम वेरम 30C, क्वासिया अमारा 30 C, फिलिक्स मास 30 C, इंडिगोफेरा टिंकटोरिया 30 C

खुराक:

रोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में डी-वॉर्म वेट ड्रॉप्स की 20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए डी-वॉर्म वेट ड्रॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

विशेष नोट: डी-वॉर्म वेट ड्रॉप्स ग्याभिन पशुओं के लिए सुरक्षित है

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

एफएमडी—फोर्ट ड्रॉप्स



संकेत

- पशुओं में खुर पका व मुँह पका होने पर मुँह में होने वाले छालों या फफोलों में विशेष लाभप्रद
- खुर पका व मुँह पका होने पर लगातार मुँह से लार टपकने को रोकने में प्रभावकारी
- खुर पका व मुँह पका के दौरान लगातार बढ़ने वाले शरीर के तापमान (बुखार) को कम करने में सहायक

संघटक

आर्सेनिक एल्बम 30, बोरेक्स 30, मर्क्यूरियस सौलुब्लिस 30, रस टोक्सीकोडेंड्रोन 30, कालियम मूरिएटिकम 30, नैट्रियम म्यूरिएटिकम 30

खुराक:

रोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में एफएमडी—फोर्ट ड्रॉप्स की 20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर पहले तीन दिन, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

विशेष निर्देश:

होमियोहील स्प्रे का प्रतिदिन मुँह व खुरों के घाव के ऊपर स्प्रे करने से शीघ्र आराम मिलता है।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए एफएमडी—फोर्ट ड्रॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

होमियोहील वेट ड्रॉप्स



- पशुओं के सभी प्रकार के घावों में प्रभावी
- पशुओं में खुरपका व मुँहपका के घावों/छालों में प्रभावी
- संक्रमित या कीड़े पड़े घावों (मेगॉटिड वार्कण्डस) को भरने में लाभकारी

संघटक

अर्निका मॉटाना 200, हाइपेरिकम परफोरेटम 200, लीडम पाल 200, रुटा ग्रेवोलेंस 200, कैलेंडुला ऑफिसिनालिस 200, रस टोक्सीकोडेंड्रोन 200, सिम्फाइटम ऑफिसिनालिस 200, बेलिस पेरेनिस 200.

खुराक:

छोटी के ¼ हिस्से में होमियोहील वेट ड्रॉप्स की 15–20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर पहले तीन दिन, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) दें और बाद में सुबह–शाम दिन में दो बार पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

विशेष निर्देश: तुरंत लाभ के लिए होमियोहील वेट ड्रॉप्स के साथ होमियोहील स्प्रे का घावों के ऊपर नियमित स्प्रे करें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए होमियोहील वेट ड्रॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

संकेत

- पशुओं के सभी प्रकार के घावों में प्रभावी
- पशुओं में खुरपका व मुँहपका के घावों/छालों में प्रभावी
- संक्रमित या कीड़े पड़े घावों (मेगॉटिड वार्कण्डस) को भरने में लाभकारी

संघटक

कैलेंडुला ऑफिसिनालिस Q, इयिनेसिया अन्गुस्तिफोलिया Q, हाइपेरिकम परफोरेटम Q, लीडम पाल Q

खुराक:

होमियोहील स्प्रे का छिड़काव पशु के घाव के ऊपर दिन में 2–3 बार घाव के पूरी तरह ठीक होने तक करें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार छिड़काव करें।

प्रस्तुति : 60 मि.ली.

होमियोहील स्प्रे



लैक्टोग्लैड-वेट संकेत ड्रॉप्स



- दुधारु पशुओं में गैलेक्टोरिया (दूध का स्वतः रिसाव होना) को रोकने में प्रभावी
- पशुओं में दूध की मात्रा व गुणवत्ता में कमी होने पर लाभकारी
- पशुओं में खाद्य व पोषक पदार्थों के शोषण व पाचन में लाभकारी

संघटक

सिलिशिया 10X, कैलकेरिया कार्बोनिका 12X, लैक कैनाइनम 10X, कोनियम मैक्युलैटम 8X, पल्सेटिला नाइप्रिकन्स

खुराक:

रोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में लैक्टोग्लैड-वेट ड्रॉप्स की 20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीम के ऊपर, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

विशेष नोट:

थर्नों व अयन में सूजन होने पर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मेस्टीनोक प्लस वेट ड्रॉप्स साथ में दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए लैक्टोग्लैड-वेट ड्रॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

लेक्सीज वेट ड्रॉप्स



संकेत

- पशुओं में कब्ज व पेट फूलने में लाभकारी
- पशुओं में रुयुमन की गति कमजोर होने पर लाभकारी
- रुमिनो-रेटिकुलर संकुचन को बढ़ाने में लाभकारी
- पशुओं में बंद लगने पर लाभकारी

संघटक

रतनहिया 200 C, मैंगनम कार्बोनिकम 200C, एलूमिना 200C, कार्बो वेजीटेबिलिस 200, काक्कूलस इंडिका 200C, सल्फर 200C, काली ब्रोमैटम 200 C

खुराक:

रोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में लेक्सीज वेट ड्रॉप्स की 15–20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीम के ऊपर, पहले दिन 5–6 बार (हर दो घंटे में) दें और पशु के थोड़ा स्वास्थ्य लाभ होने पर अगले दिन से, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

विशेष निर्देश: पशु के तुरंत स्वास्थ्य लाभ के लिए लेक्सीज वेट ड्रॉप्स को डाइजेक्स-वेट ड्रॉप्स के साथ देना अधिक सहायक होगा।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए लेक्सीज वेट ड्रॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

मेस्टीनोक प्लस वेट ड्रॉप्स



पैनो-वेट ड्रॉप्स



संकेत

- पशुओं में सब क्लीनिकल व क्लीनिकल थनैला में लाभकारी
- पशुओं में थनैला के कारण दूध का प्रवाह बाधित होने पर लाभकारी
- थनैला के कारण दूध में छीछड़े, खून और संक्रमित दूध आने पर लाभकारी
- पशुओं में थनैला के कारण दूध की मात्रा व गुणवत्ता में कमी होने पर लाभकारी

संघटक

केमोमिला 33C, एपिस मेलिफिका 33C, मर्क्यूरियस सौलुबिलस 203C, केलकारिया फॉस्फोरिका 33C, एकोनिटम नेपेलस 33C, पल्सेटिला निगरिकन्स 33C, कोनियम मैक्युलैटम 33C, फैलेंड्रियम एक्वाटिकम 33C

खुराक:

रोटी के ¼ हिस्से में मेस्टीनोक प्लस वेट ड्रॉप्स की 15–20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर पहले तीन दिन, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) दें और बाद में सुबह–शाम दिन में दो बार पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए मेस्टीनोक प्लस वेट ड्रॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

संकेत

- पशुओं में जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है
- पशुओं में लँगड़ेपन (गठिया बाई) में विशेष लाभकारी
- पशुओं में साइनोवायल शिल्ली में सूजन व दर्द होने पर लाभकारी

संघटक

एपिस मेलिफिका 6X, काली आयोडेटम 30X, ब्रायोनिया 6X, लेडुम पलुस्ट्रे 6X, मर्क्यूरियस सौलुबिलिस 6X, कैल्केरिया कार्बोनिका 30X

खुराक:

रोटी के ¼ हिस्से में पैनो वेट ड्रॉप्स की 15–20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर पहले तीन दिन, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) दें और बाद में सुबह–शाम दिन में दो बार पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए पैनो वेट ड्रॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

प्रोलीटोन सिरप



संकेत

- पशुओं के बच्चा देने से पहले या बच्चा देने के बाद गर्भाशय का पूर्णतः या आंशिक रूप से बाहर आ जाने पर विशेष लाभकारी
- गर्भाशय की सूजन व संक्रमण को रोकने में मदद करता है

संघटक

लिलियम तिग्रीनम 200 CH, पोडोफाइलम पेल्टेटम 200 CH, बेलाडोना 1M, ऐलो साकोट्रिना 30 CH, मूरेक्स पुरपुरिया 30 CH

खुराक:

छोटी के $\frac{1}{2}$ हिस्से में 5–10 मि.ली. प्रोलीटोन सिरप की मात्रा डाल कर या (5–10 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

विशेष निर्देश: तुरंत लाभ के लिए प्रोलीटोन सिरप के साथ प्रोलीटोन स्प्रे का पूर्णतः या आंशिक रूप से बाहर निकले हुए गर्भाशय के ऊपर नियमित स्प्रे करें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए प्रोलीटोन सिरप को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 100 मि.ली.

संकेत

- पशुओं के जननांगों में सूजन व संक्रमण होने के कारण ग्यारिन न होने में लाभकारी
- पशुओं के बार बार गर्भी आने में विशेष लाभप्रद
- पशुओं के जननांगों में सिस्ट बनने के कारण ग्यारिन न होने में लाभकारी
- पशुओं के ईस्ट्रस चक्र के अनियमित होने पर विशेष लाभकारी

संघटक

कैल्केरिया फॉस्फोरिकम 33C, सेपिया ऑफिसिनैलिस 33C, आलेट्रिस फैरीनोसा 33C, फॉस्फोरस 33C, औरम म्यूरिएटिकम 33C

खुराक:

छोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में रीप्रोपाल ड्रॉप्स की 15–20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) पशु के गर्भी में आने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।


नोट: अच्छे परिणाम के लिए रीप्रोपाल ड्रॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

रीप्रोपाल ड्रॉप्स



सेपोकिल सिरप



संकेत

- पशुओं में बच्चा देने के बाद होने वाली सेप्टिक की रिथर्टि के रोकथाम में लाभकारी
- गर्भाशय में सूजन व मवाद होने पर विशेष लाभप्रद
- गर्भाशय संक्रमित होने पर होने वाले तीव्र बुखार को रोकने में प्रभावकारी
- गर्भाशय से होने वाले अनियन्त्रित स्राव को रोकने में प्रभावकारी

संघटक

पाइरोजेनियम 200, पल्सेटिला निग्रिकंस 30, सिकेल कौर्नूटम 30, हेलोनियस डायोइका 30, सीपिया 30, साइलीशिया 30

खुराक:

रोटी के $\frac{1}{2}$ हिस्से में 5–10 मि.ली. सेपोकिल सिरप की मात्रा डाल कर या (5–10 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए सेपोकिल सिरप को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 180 मि.ली.

टीट हील वेट ड्रॉप्स



संकेत

थनो के फटने, चटकने (बिओई) जख्म, सूजन व मवाद आदि के लक्षण होने पर प्रभावी

संघटक

नक्स वोमिका 30, आर्सेनिकम एल्बम 30, बर्बरिस 30, सल्फर 30, इचिनेसिया अन्नुस्टिफोलिया 30

खुराक:


रोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में टीट हील वेट ड्रॉप्स की 15–20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर पहले तीन दिन, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) दें और बाद में सुबह–शाम दिन में दो बार पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

विशेष निर्देश: तुरंत लाभ के लिए टीट हील वेट ड्रॉप्स देने के साथ होमियोहील स्प्रे का थनों के ऊपर नियमित स्प्रे करें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए टीट हील वेट ड्रॉप्स चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

अडरसिन झॉप्स



संकेत

- पशुओं के अयन के सम्पूर्ण विकास में प्रभावकारी
- पशुओं की दुध ग्रंथियों को दूध बनाने के लिए विशेष उर्जा प्रदान करने में सहायक
- दुध उत्पादन में विशेष लाभकारी

संघटक

रिसिनस कौम्यूनिस 33c, उर्टका उरेंस 33c, कैल्केरिया फॉस्फोरिका 33c, फेरम फास्फोरिकम 33c, काली फॉस्फोरिकम 33c, मैग्नेशिया फॉस्फोरिका 33c, नैट्रम फॉस्फोरिकम 33c.

खुराक:

रोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में अडरसिन झॉप्स की 15–20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर पहले तीन दिन, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) दें और बाद में सुबह–शाम दिन में दो बार पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए अडरसिन झॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

यूटीनल-वेट झॉप्स



संकेत

- पशुओं में होने वाली मूत्र संबंधी समस्याओं में विशेष लाभकारी जैसे:
 - मूत्राशय में सूजन
 - मूत्राशय में पथरी हो जाना
 - पेशाब करने में जलन
 - पेशाब का बार बार आना या रुक रुक कर (चनक) आना
 - पेशाब में खून आना

संघटक

अर्निका मॉटाना 33c, कैथारिस 33c, इपीकाकुन्हा 33c, अचिलिया मिलेफोलियम 33c

खुराक:

रोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में यूटीनल वेट झॉप्स की 15–20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर पहले तीन दिन, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) दें और बाद में सुबह–शाम दिन में दो बार पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए यूटीनल वेट झॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

वार्ट ऑफ-वेट ड्रॉप्स

संकेत

- जानवरों के शरीर के किसी भी भाग (विशेषकर थनों, अयन, गले, पिछली व आगे वाली टांगों के ऊपर) होने वाले मर्स्सों या मोटे व दानेदार फफोलों में लाभप्रद

संघटक

वैक्सिनिम 33C, एंटिमोनियम टार्टारिकम 33C

खुराक:

रोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में वार्ट ऑफ-वेट ड्रॉप्स की 15–20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर पहले तीन दिन, दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) दें और बाद में सुबह–शाम दिन में दो बार पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए वार्ट ऑफ-वेट ड्रॉप्स को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

अर्निका मोंटाना Q संकेत

मदर टिंचर

- पशुओं के चोट लगने पर होने वाले धाव व दर्द को रोकने में विशेष लाभप्रद
- पशुओं के चोट लगने पर होने वाले रक्त स्राव को रोकने में विशेष मदद करता है
- धाव में मवाद और सेप्टिक बनने की प्रक्रिया को रोकता है

खुराक:

रोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में अर्निका मोंटाना मदर टिंचर की 20 बूँदें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए अर्निका मोंटाना मदर टिंचर को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.



थूजा ऑक्सिडेंटलिस मदर टिंचर



अर्निका मोंटाना ऑइंटमेट



थूजा ऑक्सिडेंटलिस ऑइंटमेट



संकेत

पशुओं के शरीर के किसी भी भाग विशेषकर जननांगों में होने वाले हर प्रकार के मर्स्सों में विशेष लाभप्रद

खुराकः

रोटी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में थूजा ऑक्सिडेंटलिस मदर टिंचर की 20 बैंडें डाल कर या (1 मि.ली.) छोटी सीरिंज (बिना सुई) में भरकर पशु की जीभ के ऊपर दिन में 3 बार (सुबह, दोपहर, शाम) पशु के पूरी तरह ठीक होने तक दें या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार दें।

नोट: अच्छे परिणाम के लिए थूजा ऑक्सिडेंटलिस मदर टिंचर को चारा देने से एक घंटे पहले या चारा देने के दो घंटे बाद दें।

प्रस्तुति : 30 मि.ली.

संकेत

- चोट लगने के कारण होने वाले दर्द व सूजन से राहत दिलाने में मदद करता है
- रक्तसाव को नियंत्रित करता है
- मवाद होने की स्थिति में सेप्टिक बनने से रोकता है

खुराकः

अर्निका मोंटाना मलहम को लगाने से पहले प्रभावित भाग को गुनगुने पानी से साफ करें फिर हल्के हाथों से मलहम को पूरे भाग में लगाएं या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार इस्तमाल करें।

प्रस्तुति : 30 ग्रम

संकेत

शरीर के किसी भी भाग में होने वाले मर्स्सों को दूर करने में विशेष प्रभावी औषधि

खुराकः

थूजा ऑक्सिडेंटलिस मलहम को लगाने से पहले प्रभावित भाग को गुनगुने पानी से साफ करें फिर हल्के हाथों से मलहम को पूरे भाग में लगाएं या पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार इस्तमाल करें।

प्रस्तुति : 30 ग्रम



ADVEN BIOTECH PVT. LTD.

GMP & ISO 9001:2015 Certified Company

Customer Care No. : 9540325325 | wecare@adven.in
INTERNATIONAL QUALITY, PROUDLY MADE IN INDIA.